



DE KWEEK 2018

Het is de tweede helft van Mei als ik dit schrijf. De kweek is voor mij grotendeels afgelopen. De jongen van de eerste

ronde zijn in de rui. De eerste tekenen hoe een putter eruit moet zien tonen zich.



De jongen van de laatste ronde zitten op de nestrand klaar om de wijde wereld in te vliegen.

Het is nog steeds vooral (major) putters wat ik kweek en hybriden in deze. Meestal putterman met kanariepop.

Dit jaar heb ik ook een poging gedaan putterman met goudvinkenpop. En wel een bruine pop met split bruine putterman.

Enkele gebeurtenissen wat betreft de kweek wil ik jullie niet onthouden.

Gebeurtenis 1

Bij een koppel putters is het mannetje zeer driftig en copuleert in mijn bijzijn.

Het vrouwtje heeft nauwelijks iets aan nestbouw gedaan. Maar in het tounestje worden vier eitjes gelegd. Het vrouwtje gaat niet over tot broeden.

Vermoedelijk is de broeddrift niet groot genoeg. De eitjes heb ik elders ondergebracht. Hieruit heb ik drie jongen gekweekt.

Gezien de drift bij het mannetje had ik deze na het derde eitje apart gezet.

Na deze poging heb ik het mannetje weer toegelaten bij het vrouwtje.

In een kort tijdsbestek wordt een goed nest gebouwd en vijf eitjes gelegd.

Gezien zijn gedrag wordt het mannetje wederom na het derde ei, in het zicht van het vrouwtje apart gezet. Het vrouwtje broedt nu wel.

Na 13 dagen komen de jongen uit, die goed gevoerd worden. Althans de eerste twee dagen. De derde dag liggen de jongen gemolesteerd op de bodem van de kooi.

Het vrouwtje hangt nu tegen de draad bij het mannetje. Wanhoop nabij. Wat nu gedaan?

Ik laat het mannetje weer toe. Het hele spel begint weer van voren af aan. Alleen nu laat ik, met enige twijfel, het mannetje bij het vrouwtje.

Er worden vier eitjes gelegd, die goed bebroed worden. Het mannetje voert het vrouwtje op het nest. Als deze laatste het nest verlaat gaat het mannetje op de eitjes zitten. Effe later neemt het vrouwtje het weer over. Uit de eitjes komen drie jongen die door beide ouders worden gevoerd. Inmiddels zijn ze al uitgevlogen. Perfect. Zo zie je maar dat je niet te snel de hoop moet opgeven

Gebeurtenis 2

Bij het koppel goudvink – putter gaat het vrouwtje al vroeg over tot nestbouw. Hierin worden zes eitjes gelegd. De eitjes heb ik in volgorde van leggen gemarkeerd. Vreugde alom twee eitjes zijn bevrucht. De eitjes drie en vier.

Merkwaardig waarom vijf en zes niet?? Ook hier heb ik de man na het derde eitje apart gezet. Na de broedduur komen de twee eitjes uit. Het voeren lijkt minder goed te gaan door het vrouwtje.

De jongen heb ik onder een putter vrouwtje gelegd, die jongen had van dezelfde leeftijd.

Met een jong is dit goed afgelopen. Op het moment zit het midden in de jeugdruï.

Ondertussen heeft het popje wederom eitjes gelegd.

Soortgelijk verhaal als voorheen. Eitje drie is bevrucht en de rest niet.

Normaal althans dat is mijn ervaring bij de putters, ook als het mannetje maar eenmaal copuleert zijn alle eitjes bevrucht. Waarom hier niet??

Deze vraag heb ik bij enkele dierenartsen neergelegd. De antwoorden wil ik jullie niet onthouden.

Als eerste Dienkliniek Hulst

Dit komt natuurlijk vaak voor , de uitleg is een complexe zaak.

Mvgr
Yves Aerts

Dierenartsenpraktijk Trigenio
Wij krijgen de laatste tijd zoveel mails binnen met vragen dat de dierenarts zich een hele dag kan bezig houden met antwoorden formuleren op zijn computer waarop dan meestal nog een reply volgt. Wij moeten dit spijtig genoeg beperken ...

Mogelijk is er een mindere kiemkracht van vijfde en zesde ei vanwege reserves pop.

Altijd welkom voor een onderzoek in Trigenio na afspraak.

Peter

Hedwig van de Horst

Beste Jan,

Het popje kan het sperma van het mannetje een tijdje opslaan in plooitjes van het slijmvlies van de cloaca. Het varieert per vogelsoort hoe lang dat sperma vruchtbaar blijft. Ook heb je natuurlijk invloed van de voeding die het popje eet, de stress die zij eventueel zou hebben, de conditie van het dier, eventuele ziekten etc. Zo kan het voorkomen dat bij de ene eisprong sperma vrij komt en kan bevruchten en bij de andere eisprong niet. Als de man

treedt is er een iets grotere kans op bevruchting omdat het sperma dan "vers" de weg naar het eitje kan afleggen, maar ook dan zijn er obstakels afhandelijke van de hormoonhuishouding van het popje en de toestand in de eileider.

Met vriendelijke groeten,

Hedwig van der Horst

Hier moeten we het (effe) mee doen.

Contactpersoon regio 9 BEC
Jan van Overmeeren